



Frugt

Frugtbarhed.	Moderat - lav.
Farve på frugt	Pæn farve på frugter, da sollyset let trænger ind.
Størrelse på frugt	Typisk over middel.
Anvendelse	Spises frisk, kompot, most, syltning, vin m.m.
Blomster	Moderat – lav blomstersætning, som sidder på sporer eller som rosetter på yngre grene.
Bestøverforhold	Kræver fremmedbestøvning, medmindre andet er angivet.
Modning	Juli - oktober.

Vækst

Vækstform	Kegleformet spindelvækst, med sidegrene.
Vækstkraft	Middel – kraftigvoksende frugttræ. Udvokset ca. 6 – 10 m.
Velegnet i krukker	Nej, højt vandings- såvel næringsbehov.
Velegnet i sandjord	Ja.
Beskæring	Kræver årlig beskæring, evt. efter høst af frugter eller i juli måned for at mindske energireserverne. Vinterbeskæring i januar/februar vil give mange vandriss det efterfølgende år. Grene tykkere end 1/3 af hovedstammen bør skæres bort.

Sundhed

Gødskning	Etableres evt. med kompost i plantehullet. Senere er gødning ikke nødvendigt.
Sygdomme og skadedyr	Kan være følsom ved stress f.eks. vand- eller næringsmangel. Mange andre kulturrelaterede sygdomme/skadedyr kan forekomme, vælg sunde, resistente og afprøvede sorter.
Forårsfrost	Sen forårsfrost kan resultere i begrænset frugtsætning i enkelte kulturer.
Bemærkninger	Stort træ, som er velegnet i åbne landskaber, den store landbo have eller i sandet jord og blæst f.eks. ved kystnært sommerhus. Spindeltræer er formet med en top og vandrette sidegrene, som over tid vokser sig med en rund krone, såfremt der ikke formes.



